

小兒氣切造口照護衛教單張

此衛教單張可讓您清楚了解氣切造口照護正確技術，照著步驟每日執行1-2次，可以保持氣切造口的完整性並可降低感染機率，您可以做得很好的！

目的：執行氣切造口照護可避免傷口感染，減少分泌物產生。

◎準備用物：

1. 優碘（非酒精性碘酒!! 碘酒會過度刺激傷口）（圖示一）



（圖示一）



（圖示二）

2. 生理食鹽水（建議使用小罐單包裝，用完即丟就較不易感染）（圖示二）
3. 無菌棉棒（收納時須注意棉頭不能染污）
4. Y型紗布

◎步驟：

1. 洗手並擦乾，戴上手套
2. 若病童痰液較多，請先執行抽痰
3. 取下舊的Y型紗布
4. 觀察氣切傷口狀況，是否有紅腫或分泌物情形(如有可回報您的個管師或照護人員)
5. 棉棒3隻沾優碘，3隻沾生理食鹽水
6. 先以優碘棉棒，圍繞氣切口由內而外環狀消毒，不可來回擦拭，重覆執行三次，並最後停留30秒。（圖示三）



(圖示三)

7. 再以生理食鹽水棉棒，以一樣的方式由內而外擦拭，執行三次。
8. 將新的無菌Y型紗布開口朝上放入，盡量勿碰觸到紗布切口處及氣切管。
9. 確認氣切固定帶是否需更換或調整鬆緊，鬆緊以一指寬為宜，切勿過鬆，以免氣切滑脫。
10. 以上步驟請每天至少執行一次，如痰量多可增加次數。
11. 若氣切管滑脫，請嘗試自行放入，如無法放入則使用抽痰管插入氣管內，可連接氧氣，並打119求助，過程中需觀察血氧及呼吸型態。



保健安居呼吸照護機構

小兒呼吸治療師

蔡亦菱

電話：0978-311693



保健安協會官網：

<http://www.tbtakecare.com.tw/>

掃一下，加入我們吧！